

Requisitos para Donantes de Sangre, continuación

<p>Le pedimos que No Done Si usted:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ha tenido síntomas de gripe y no se siente bien el día de la donación. • Ha tenido hepatitis después de cumplir los 11 años. • Ha tenido contacto cercano con alguien con hepatitis clínica en los últimos 12 meses. • Ha tenido historia de cáncer en el último año (excepto algún cáncer en la piel o in situ). • Ha tenido una transfusión, perforación en orejas/piel**, acupuntura**, piquete de aguja accidental o ha estado en contacto con la sangre de otra persona en los últimos 12 meses. (**Los procedimientos de perforaciones de orejas/piel y acupuntura pueden ser aceptables dependiendo del tipo de técnica usada.) • Está donando en Blood Center of the Pacific o en United Blood Services Central Coast o en el Community Blood Bank (Rancho Mirage) y se ha hecho un tatuaje en los últimos 12 meses. • En otros locales de United Blood Services, los tatuajes pueden ser aceptables si se realizaron en establecimientos regulados en un estado aprobado. Llame a su centro local para la lista de estados aprobados. • Ha tenido malaria en el pasado o ha viajado a un área endémica de malaria en los últimos 12 meses. • Está o ha estado embarazada en las 6 semanas pasadas. • Ha sido tratado por sífilis o gonorrea en los últimos 12 meses. • Ha usado una aguja para inyectarse drogas no prescritas (incluyendo esteroides) • Está en riesgo de exposición al VIH, el virus que causa SIDA. • Ha sido diagnosticado por un médico con síndrome de fatiga crónica.
--	--

Si usted toma medicamentos, probablemente sea elegible para donar. Esta es una lista de medicamentos que pueden evitar que usted done por un periodo de tiempo:

Medicamento	Período de Espera
Antibiótico u otro medicamento para infección	Hasta que termine de tomarlo y no tenga síntomas de infección
Proscar, Propecia, finasterida, Accutane, isotretinoína, Amnesteem, Claravis, Sotret	Un mes después de la última dosis
Avodart, dutasterida, Arava, leflunomida	Seis meses después de la última dosis
Transfusión de sangre, vacunas sin licencia o inyección de inmunoglobulina de hepatitis B dada después de una exposición a hepatitis B (este es el tratamiento que sigue a la exposición, no la vacuna)	Un año después de la última dosis
Soriatan, acitretina	Tres años después de la última dosis
Tigason, etretinato, hormona de crecimiento de glándulas pituitarias humanas, insulina de bovino o res, concentrados de factores coagulantes	No pueden donar sangre

Por Favor Haga Una Lista de Viajes

Viaje a Europa desde 1980: Albania, Andorra, Austria, Las Azores (Portugal) Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Islas Canarias (España), Ceuta (España) Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Guayana Francesa (Francia), Alemania, Grecia, Guadalupe (Francia) Hungría, Irlanda (República de Irlanda), Isla de Alborán (España), Islas Chafarinas (España), Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia, Isla de la Martinica (Francia), Mayotte o Mahoré (Francia), Melilla (España), Mónaco, Países Bajos, Noruega, Peñón de Alhucemas (España), Peñón de Vélez de la Gomera (España), Polonia, Portugal, Isla de la Reunión (Francia), Rumania, San Marino, Serbia, República Eslovaca (Eslovaquia), Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía (sólo bases militares), Reino Unido (incluyendo Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia, Gales, La Isla de Man, Las Islas del Canal, Gibraltar, y las Islas Malvinas), Ciudad del Vaticano, y la República Federal de Yugoslavia.

País Europeo	Fechas de Llegada y Salida	Duración de la Estancia

Otros Viajes Fuera de los Estados Unidos (últimos 12 meses):

País (incluya áreas/regiones y ciudades)	Fecha de Salida de este País